PA0	Mucosite: Aspect inflammatoire de la muqueuse péri-implantaire avec œdème, saignement au sondage et absence de perte osseuse (profondeur de sondage < 4 mm)
PA1 – Un seul implant atteint	· PA1a = perte osseuse < 60 % de la hauteur implantaire, à 0 paroi · PA1b = perte osseuse < 60 % de la hauteur implantaire, défaut de 1 à 4 parois avec cratère < 3 mm · PA1c = perte osseuse < 60 % de la hauteur implantaire, défaut de 1 à 4 parois avec cratère > 3 mm · PA1d = perte osseuse > 60 % de la hauteur implantaire et/ou implant mobile et/ou récidive sur un implant déjà traité pour une péri-implantite
PA2 – Deux implants adjacents	· PA2a = perte osseuse < 60 % de la hauteur sur les 2 implants, à 0 paro · PA2b = perte osseuse < 60 % de la hauteur implantaire, défaut de 1 à 4 parois avec cratère < 3 mm sur les 2 implants · PA2c = perte osseuse < 60 % de la hauteur implantaire, défaut de 1 à 4 parois avec cratère > 3 mm sur les 2 implants · PA2d = perte osseuse > 60 % de la hauteur implantaire sur 2 implants et/ou implants mobiles et/ou récidive sur des implants déjà traités pour une péri-implantite
PA3 – Plus de trois implants adjacents atteints	· PA3a = perte osseuse < 50 % de la hauteur sur des implants adjacents séparés de plus de 3 mm, avec ou sans cratère · PA3b = perte osseuse < 50 % de la hauteur sur des implants adjacents séparés de moins de 3 mm, avec ou sans cratère · PA3c = perte osseuse > 50 % de la hauteur et/ou implants mobiles et/ou récidive sur des implants déjà traités pour une péri-implantite
PA4 – Implant pilier de prothèse complète supra-implantaire)	· PA4a = perte osseuse < 50 % de la hauteur implantaire, 0 paroi · PA4b = perte osseuse < 50 % de la hauteur implantaire, avec ou sans cratère, défaut de 1 à 4 parois · PA4c = perte osseuse > 50 % de la hauteur implantaire